

Rencontres et échanges hôpital – associations



14/03 /2008



SURMIV
ASSOCIATIONS



IST - Sexualité – Education

GRANDE ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ DES FRANÇAIS

2007



SURMIV
ASSOCIATIONS



Faut – il réadapter le discours de prévention ?



Les hommes seraient – ils toujours en avance sur les femmes ?

OUI mais ,

- Uniquement pour le nombre de partenaires sexuels
 - 4 - 5 partenaires / femme
 - Au moins 10 partenaires / homme
- Sexualité protégée , sinon
 - Exposition au risque d'infections !!



Information sur les risques d'IST

- Par Qui?
 - Un médical
 - Non médical
- A qui ? Comment ?
 - Former et informer
 - Ne pas effrayer mais ne pas banaliser
 - Ne pas juger
- Quand ?




Les IST

- Syphilis
- Infection de l'urètre par chlamydia
- Infection de l'anus par chlamydia
- Lymphogranulomatose vénérienne
- Chaude pisse ou gonocoque
- Aphte ou l'herpès simplex
- HPV ou crête de coq
- Hépatite B
- Hépatite C
- Gale (scabiose – sarcopte)
- VIH





IST : les signes chez l'homme

- **Écoulement de l'urètre :**
 - liquide clair , pus, sang ,
- **Brûlures en urinant**
- **Inflammation , irritation du gland sous le prépuce**
- **Sang dans le sperme**
- **Inflammation de l'épididyme**
- **Inflammation du testicule**
- **Inflammation de la prostate**



IST : les signes chez la femme

- Pertes = leucorrhée
- Grattage = démangeaison
- Douleur pendant les rapports
- Gonflement des parties = œdème de la vulve
- Inflammation de la trompe
- Inflammation de l'utérus
- Brûlures urinaires
- Uriner souvent avec douleur




IST signes communs ♂ - ♀

- **Ulcères du gland, de la vulve ...= Chancre**
- **Ganglions = adénopathies,**
- **Inflammation de l'anus = anite**
- **Inflammation du rectum = rectite**
- **Crêtes de coq = condylomes = végétations**

- **Brûlures pour uriner**
- **Inflammation des conjonctives**
- **Ulcère dans la bouche : chancre buccal,**
- **Boutons de la peau : éruption cutanée**





SURMIV
ASSOCIATIONS





SURMIV
ASSOCIATIONS



Libération des pratiques sexuelles

Sexualité orale

- Fellation 80%
- Cunnilingus 85%
- Reste quand même un tabou
- Risque d'IST +++





Les IST... le retour !!

- Une seul remède !

– **Le sexe avec le préservatif**

Et les tests rapides ?



Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle

*Pietro Vernazza^a,
Bernard Hirschel^b,
Enos Bernasconi^c,
Markus Flepp^d*

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2008;89: 5



SURMIV
ASSOCIATIONS



Patients VIH et Virus indétectable

- **Déclaration du chercheur suisse**
 - **Couples séro- différents**
 - Si Virus indétectable depuis longtemps / pas de préservatifs
- **Conseil National du Sida de France:**
 - **Prudence ...**
 - Le traitement contre le virus doit avoir supprimé les virus dans le sang depuis au moins six mois
 - Le traitement contre le virus doit être systématiquement suivi par le patient (observance sans faille) et contrôlé régulièrement
 - Aucune autre IST .



La sécurité négociée

Le concept naît en Australie

- Utiliser un préservatif durant les 3 premiers mois de la vie en couple,
- puis faire un test pour chaque partenaire. Si le résultat est négatif, l'abandon du préservatif est possible sous réserve que les rapports sexuels en dehors du couple soient protégés.
- Cet accord est basé sur la confiance.
- Le partenaire qui prends un risque avec une personne d'un soir doit avertir son ami (e) et envisager de recommander le cycle (test, préservatif , test...).

Faut – il réadapter le discours de prévention ?

- **Oui et non !**
 - Un discours à la carte +++
- **Informéer +++, s'informéer +++**
- **Se former et former les informateurs**

