

FUZEON®

DCI : Enfuvirtide
Famille : Inhibiteur de fusion
Laboratoire : ROCHE (information ☎ 01.46.40.50.00)
Formes galéniques : Poudre et solvant pour solution injectable
Dispensation à l'hôpital et en ville
Coût de traitement journalier : 51.66 €

INDICATION : Traitement des patients infectés par le VIH1 exposés et en échec à un traitement comprenant au moins un médicament de chacune des classes antirétrovirales suivantes : inhibiteurs de protéase, analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse et analogues nucléosidiques de la transcriptase inverse ou présentant une intolérance aux médicaments précités.

POSOLOGIE RECOMMANDEE :

Adultes et adolescents ≥ 16 ans : 90 mg deux fois par jour

Enfants ≥ 6 ans :

Poids (kg)	Dose par injection bi-quotidienne (mg/dose)	Volume injecté (90 mg d'enfuvirtide / ml)
11.0 à 15.5	27	0.3 ml
15.6 à 20.0	36	0.4 ml
20.1 à 24.5	45	0.5 ml
24.6 à 29.0	54	0.6 ml
29.1 à 33.5	63	0.7 ml
33.6 à 38.0	72	0.8 ml
38.1 à 42.5	81	0.9 ml
≥ 42.6	90	1.0 ml

MODALITES DE PRISE :


Injection sous cutanée dans la partie haute du bras, la face antérieure de la cuisse ou de l'abdomen.

Changer de site à chaque injection.

Ne jamais secouer le flacon ou le renverser pour le mélanger: laisser reposer le flacon afin de permettre la dissolution complète. La poudre peut mettre jusqu'à 45 minutes pour se dissoudre en solution.

Afin de réduire le risque d'apparition de nodule au point d'injection, application concomitante de corticoïdes ou d'AINS locaux.

Exemple de schéma de prises :



EFFETS INDESIRABLES :

- **Infections** : sinusite, papillome cutané, grippe, pneumonie, infection de l'oreille.
- **Réactions au site d'injection (98 %)**: douleur, érythème, indurations, nodules et kystes, prurit, echymoses.
- **Troubles de la circulation lymphatique**: lymphadénopathie.
- **Trouble de la nutrition**: perte d'appétit, anorexie, perte de poids.
- **Troubles psychiatriques**: anxiété, cauchemars, irritabilité.
- **Troubles neurologiques**: neuropathie périphérique, hypoesthésie, trouble de l'attention, tremor.
- **Troubles oculaires** : conjonctivite.
- **Trouble de l'oreille et du conduit auditif**: vertiges.
- **Troubles gastro intestinaux**: pancréatite, reflux gastro oesophagien.
- **Troubles cutanés**: sécheresse cutanée, eczéma séborrhéique, érythème, acné.
- **Troubles musculaires**: myalgie.
- **Troubles rénaux**: calcul rénaux, hématurie.
- **Anomalies métaboliques**: hypertriglycéridémie, diabète.
- **Anomalie biologique**: hyperéosinophilie.

CONTRE INDICATIONS :

- Réaction d'hypersensibilité systémique au principe actif ou à l'un des excipients

MISE EN GARDE :

- Coïnfectés VHB et/ou VHC.
- Insuffisance rénale sévère.
- Altération de la fonction hépatique.
- Grossesse.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : ne pas utiliser un solvant autre que celui fournit.