

RESCRIPTOR

ATU nominative

DCI : Delavirdine
Famille : Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse : **INNTI**
Laboratoire : PFIZER (information ☎ 01.58.07.34.40).
Formes galéniques : comprimés pelliculés à 200 mg
Dispensation hospitalière
Coût de traitement journalier : 8.22 €

INDICATION : Infection à VIH chez l'adulte, toujours en association, pour des patients ayant un déficit immunitaire évolutif ou un stade avancé.

POSOLOGIE RECOMMANDÉE :

Adulte (≥ 16 ans) 1 200 mg/j en 3 prises, soit 2 comprimés à 200 mg matin, midi et soir.


ADAPTATION POSOLOGIQUE :

- En cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère (non établie).
- En cas d'association avec certains autres médicaments (Cf plus loin).

MODALITES DE PRISE :

- Administration au cours ou en dehors des repas.
- Administration des comprimés tels quels (car les comprimés à 200 mg ne se dispersent pas facilement dans l'eau).
- Possibilité de prendre les comprimés tels quels ou de les disperser dans un demi verre de liquide (eau, jus de fruit, boisson non alcoolisée). Laisser reposer quelques minutes, remuer et absorber.

Exemple de schéma de prises :



CONTRE INDICATIONS :

- Hypersensibilité sévère à l'un des composants du médicament.
- Co-administration avec des médicaments métabolisés par le CYP3A : **cisapride** (PRÉPULSID[®]), **amiodarone** (CORDARONE[®], CORBIONAX[®]), **quinidine** (KINUREA[®], QUININE[®], QUINOFORME[®], HEXAQUINE[®], QUINIMAX[®], QUINISEDINE[®]), **triazolam** (HALCION[®]), **alprazolam** (XANAX[®]), **midazolam** (HYPNOVEL[®]), dérivés de l'ergot de seigle : **ergotamine** (GYMERGENE CAFEINE[®], MIGWELL[®]), **dihydroergotamine** (DIHYDROERGOTAMINE[®], SEGLOR[®], TAMIK[®], IKARAN[®]).
- Grossesse et allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- **Eruption cutanée** (urticitaire, éruption maculopapuleuse) (15 %).
- Nausées, diarrhées, vomissement.
- Asthénie, céphalées, anorexie, fièvre.
- Neutropénie, augmentation des gammaGT, augmentation des ALAT et ASAT.
-

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

■! Associations contre indiquées :

- Médicaments métabolisés par le CYP3A avec **risque d'arythmie cardiaque** : **cisapride** (PRÉPULSID[®]), **Amiodarone** (AMIODARONE[®], CORDARONE[®], CORBIONAX[®]), **quinidine** (KINUREA[®], QUININE[®], QUINOFORME[®], HEXAQUINE[®], QUINIMAX[®], QUINISEDINE[®]),
- Médicaments métabolisés par le CYP3A avec **risque de sédation prolongée ou de dépression respiratoire** : **triazolam** (HALCION[®]), **alprazolam** (XANAX[®]), **midazolam** (HYPNOVEL[®]),
- Médicaments métabolisés par le CYP3A avec **risque d'ergotisme** : dérivés de l'ergot de seigle : **ergotamine** (GYNERGENE CAFEINE[®], MIGWELL[®]), **dihydroergotamine** (DIHYDROERGOTAMINE[®], SEGLOR[®], TAMIK[®], IKARAN[®]).

■ Associations non recommandées :

- **Rifampicine** (RIMACTAN[®], RIFATER[®], RIFINAH[®], RIFADINE[®]) : association non recommandée en raison de l'induction significative du CYP3A par la Rifampicine, avec diminution des taux plasmatique de Rescriptor.

■ Précautions d'emploi avec :

- Prendre à distance de la **didanosine** (VIDEX[®]) : le Videx doit être administré au moins une heure avant ou après la prise de Rescriptor.
- **Indinavir** (CRIKIVAN[®]) : diminuer la posologie de Crixivan à 600 mg X 3/j ou 400 à 600 mg X 2/j avec Norvir à 200 mg/j.
- **Ritonavir** (NORVIR[®]) : pas d'adaptation posologique, sauf si apparition d'intolérance liée à l'augmentation des concentrations de Norvir.
- **Nelfinavir** (VIRACEPT[®]) : possibilité d'augmenter les doses de Rescriptor à 600 mg X 3/j.
- **Rifabutine** (ANSATIPINE[®]) : augmenter les doses de Rescriptor entre 600 et 1 000 mg X3/j et diminuer les doses de Rifabutine à 150 mg/j.
- Risque de diminution des taux plasmatiques de Rescriptor avec : **phénytoïne** (DI-HYDAN[®], DILANTIN[®]), **phénobarbital** (APAROXAL[®], GARDENAL[®], KANEURON[®], ALEPSAL[®]), et **carbamazépine** (TEGRETOL[®]).
- Surveillance avec les inducteurs enzymatiques pouvant augmenter les concentrations de delavirdine : **clarithromycine** (NAXY[®], ZECLAR[®]), **fluconazole** (TRIFLUCAN[®]), **kétoconazole** (NIZORAL[®]), **fluoxétine** (PROZAC[®]).
- Antiacide : doivent être pris au moins une heure avant ou après Rescriptor.
- Possibilité de diminution de l'absorption de Rescriptor par **cimétidine** (CIMETIDINE[®], STOMEDINE[®], TAGAMET[®]), **ranitidine** (AZANTAC[®], RANIPLEX[®], ULCIREX[®]), **famotidine** (PEPCIDAC[®], PEPDINE[®]), **nizatidine** (NIZAXID[®]).
- **Méthadone** : réduire un peu les doses de méthadone car risque d'augmentation des concentrations plasmatiques de ce produit avec Rescriptor.
- **Bupropion** (ZYBAN[®]) : augmentation du taux plasmatique de Zyban.
- **Pansements intestinaux** : Prise à distance des antirétroviraux car risque de malabsorption de ces derniers.

RESISTANCES CROISEES : Des résistances croisées entre les autres analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse sont quasi systématiques.