

ZEFFIX®

DCI :	Lamivudine
Famille :	Inhibiteur nucléosidique
Laboratoire :	GLAXOSMITHKLINE (information ☎ 01 39 17 84 44)
Formes galéniques :	comprimés pelliculés 100 mg
Dispensation	À l'hôpital et en ville
Coût de traitement journalier :	3,23 € à 3,49 €

INDICATION :

Traitement de l'hépatite chronique B non décompensée et décompensée.

POSOLOGIE RECOMMANDÉE :

100 mg/jour soit 1 cp par jour.

Administration possible chez l'enfant âgée de 2 ans et plus et chez l'adolescent atteint d'hépatite chronique B non décompensée.


ADAPTATION :

Recommandations posologiques en cas d'insuffisance rénale :

Clairance de la créatinine (ml/min)	Dose initiale (solution buvable)	Dose d'entretien (en une prise journalière)
30 ≤ CI < 50	20 ml (100 mg)	10 ml (50 mg)
15 ≤ CI < 30	20 ml (100 mg)	5 ml (25 mg)
5 ≤ CI < 15	7 ml (35 mg)	3 ml (15 mg)
CI < 5	7 ml (35 mg)	2 ml (10 mg)

MODALITES DE PRISE : Administrer par voie orale, au cours ou endehors d'un repas.

Exemple de schéma de prises :



EFFETS INDESIRABLES :

- Asthénie, céphalées.
- Douleurs ou gêne abdominale, nausées, vomissements et diarrhée
- Augmentation du taux de CPK ou d'ALAT chez le patient porteur d'une hépatite chronique B
- Rares cas de pancréatite ou de neuropathie périphérique, notamment chez le patient co-infecté VIH-VHB.
- Très rares cas d'acidose lactique associée à une hépatomégalie et stéatose hépatique, chez le patient co-infecté VIH-VHB.

CONTRE INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à la Lamivudine ou à tout autre composant de la spécialité.

MISE EN GARDE :

- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie selon le schéma ci-dessus
- Aggravation de l'hépatite B chronique à l'arrêt inopiné du ZEFFIX, caractérisée par une augmentation transitoire des taux sériques d'ALAT. Surveillance nécessaire jusqu'à 12 semaines après l'arrêt.
- Risques potentiels de sélection de souches VHB résistantes à la Lamivudine.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

■ Précautions d'emploi :

Médicament néphrotoxique à élimination rénale (exemple : triméthoprine, avec adaptation de posologie en cas d'insuffisance rénale)

■ Associations déconseillées :

Zalcitabine (HIVID®) : risque cumulé de neuropathie.